

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

# neo-angin®

HALSTABLETTEN

### KIRSCH

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Wirkstoffe in einer Lutschtablette:

2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,20 mg, Amylmetacresol 0,60 mg, Levomenthol 5,72 mg

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 – 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind neo-angin® Halstabletten Kirsche und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten Kirsche beachten?
3. Wie sind neo-angin® Halstabletten Kirsche anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin® Halstabletten Kirsche aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind neo-angin® Halstabletten Kirsche und wofür werden sie angewendet?

neo-angin® Halstabletten Kirsche sind ein Hals- und Rachen therapeutikum.

Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten Kirsche beachten?

neo-angin® Halstabletten Kirsche dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren (Levomenthol).

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie neo-angin® Halstabletten Kirsche anwenden.

Bei Fieber, bakterieller Halsentzündung und/oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, da gegebenenfalls eine systemische Antibiotikagabe erforderlich ist.

#### Kinder

Bei der Anwendung an Kindern ist zu beachten, dass diese die Fähigkeit zu kontrolliertem Lutschen erworben haben müssen.

#### Anwendung von neo-angin® Halstabletten Kirsche zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halstabletten Kirsche in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halstabletten Kirsche sollten in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Es liegen keine Studien zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit am Menschen vor.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

neo-angin® Halstabletten Kirsche haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

neo-angin® Halstabletten Kirsche enthalten Ponceau 4R (E 124), Benzylalkohol, Butylhydroxy-anisol (E 320) und Isomalt (E 953)

Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 1,05 mg Benzylalkohol pro Lutschtablette entsprechend 0,04 % (w/w).

Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, da sich in Ihrem Körper große Mengen Benzylalkohol anreichern und Nebenwirkungen verursachen können (so genannte "metabolische Azidose").

Das Kirscharoma dieses Arzneimittels enthält Butylhydroxyanisol, welches örtlich begrenzt Reizungen der Schleimhäute hervorrufen kann.

neo-angin® Halstabletten Kirsche enthalten Isomalt. Bitte nehmen Sie neo-angin® Halstabletten





Kirsche erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 2,57 g Isomalt (Zuckeraustauschstoff), was einem Kalorienwert von 6 kcal (26 Kilojoule) entspricht. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

#### **neo-angin® Halstabletten Kirsche enthalten Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält im Farbstoff Ponceau 4R (E 124) weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

#### **3. Wie sind neo-angin® Halstabletten Kirsche anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren alle 2 - 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden).

#### **Wenn Sie mehr neo-angin® Halstabletten Kirsche eingenommen haben als sie sollten**

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde kein Fall von Überdosierung berichtet. Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Überdosierung können die beschriebenen Nebenwirkungen verstärkt auftreten. In diesem Fall wird eine symptomatische Behandlung empfohlen.

#### **Wenn Sie die Anwendung von neo-angin® Halstabletten Kirsche vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bei sich bemerken, unterbrechen Sie die Anwendung von neo-angin® Halstabletten Kirsche und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt:**

#### **Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen):**

Es sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber einem der Inhaltsstoffe möglich.

Es können Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie sind neo-angin® Halstabletten Kirsche aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis (Blisterpackung) und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 30 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was neo-angin® Halstabletten Kirsche enthalten**

Die Wirkstoffe in einer Lutschtablette sind:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 2,4-Dichlorbenzylalkohol | 1,20 mg |
| Amylmetacresol           | 0,60 mg |
| Levomenthol              | 5,72 mg |

Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt, Kirscharoma (enthält unter anderem Benzylalkohol und Butylhydroxyanisol [E 320]), Weinsäure, Sucralose, Ponceau 4R (E 124)

##### **Inhalt der Packung**

Originalpackung mit 12, 24 bzw. 48 Lutschtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer**

DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin

##### **Hersteller**

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2025.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den:

**Klosterfrau Informationsdienst**

D-50606 Köln

Tel.: 0800/1652 – 100, Fax: 0800 1652 – 700, E-Mail: [dialog@klosterfrau-service.de](mailto:dialog@klosterfrau-service.de)